

1) Harde locatie VRVP (nest) op basis van telonderwerp

| Kolonievogels VRVP tijdelijk gebruik | Soort groepen | Telonderwerp | Soort (Nederlands) | Gedrag | Verblijfplaats | Aantal van Aantal |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------|----------------|-------------------|
| Ja | Vogels | bewoningssporen | Dwergstern | | | 1 |
| | | | Stormmeeuw | | | 1 |
| | | | Visdief | | | 3 |
| | | nest | Blauwe Reiger | | | 1 |
| | | | Oeverzwaluw | | | 1 |
| Eindtotaal | | | | | | 7 |

2) Indicatie VRVP (nest) op basis van telonderwerp

| Kolonievogels VRVP tijdelijk gebruik | Soort groepen | Telonderwerp | Soort (Nederlands) | Gedrag | Verblijfplaats | Aantal van Aantal |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Ja | Vogels | broedpaar | Kluut | parend / copula | | 4 |
| | | territorium | Dwergstern | vastgesteld terr | | 2 |
| | | | Oeverzwaluw | niet van toepas | | 2 |
| | | | | vastgesteld terr | | 3 |
| Eindtotaal | | | | | | 11 |

3) Harde locatie VRVP op basis van gedrag

| Kolonievogels VRVP tijdelijk gebruik | Soort groepen | Telonderwerp | Soort (Nederlands) | Gedrag | Verblijfplaats | Aantal van Aantal |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Ja | Vogels | territorium | Dwergstern | vastgesteld terr | | 2 |
| | | | Oeverzwaluw | vastgesteld terr | | 3 |
| Eindtotaal | | | | | | 5 |

4) Indicatie VRVP (nest) op basis van gedrag

| Kolonievogels VRVP tijdelijk gebruik | Soort groepen | Telonderwerp | Soort (Nederlands) | Gedrag | Verblijfplaats | Aantal van Aantal |
|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Ja | Vogels | broedpaar | Kluut | parend / copula | | 4 |
| | | levend exemplaar | Grote Zilverreiger | baltsend/zinger | | 1 |
| | | | Kleine Zilverreiger | baltsend/zinger | | 1 |
| | | | Visdief | baltsend/zinger | | 1 |
| | | | | nest-indicerend | | 2 |
| Eindtotaal | | | | | | |

Kolonievogels broeden doorgaans jaren achtereen op dezelfde locatie. Tijdens het broedseizoen kunnen in het gebied ook andere broedvogels worden aangetroffen.

Harde locatie VRVP (nest) op basis van telonderwerp (overzicht 1)

Wanneer het telonderwerp "kolonie", "nest", "pas gebruikt nest of eierschalen", "bewoningssporen" betreft, zoals in het bovenste overzicht, dan is de locatie van het nest/ kolonie met zekerheid vastgesteld en op de juiste locatie op kaart weergegeven.

Ook uit de volgende 5 gedragingen (zie overzicht 3) kan met 100% zekerheid worden gesteld dat er een nest/ broedkolonie van een van deze soorten aanwezig is:

- Bezoek aan nestplaats
- Broedend
- Eieren afzettend
- Nestbouw
- Uithakken/graven nestholte

Indicatie VRVP (nest) op basis van telonderwerp (overzicht 2)

Betreft het andere telonderwerpen dan **kunnen** deze (in combinatie met grotere aantallen) nestindicerend zijn voor een locatie binnen het werkgebied.

Harde locatie VRVP op basis van gedrag (overzicht 3)

Op basis van het gedrag (zoals "nestbouw" of "slapend") kunnen ook harde locaties worden vastgesteld van Vaste Rust- en Verblijfplaatsen te weten: nesten, rust- en slaapplekken.

Indicatie VRVP (nest) op basis van gedrag (overzicht 4)

Betreft het andere gedragingen (zoals "transport voedsel of ontlasting) dan **kunnen** deze (soms in combinatie met grotere aantallen) nestindicerend zijn voor een locatie binnen het werkgebied.