

GGD Flevoland Aanbesteding Laboratoriumdiensten: Bijlage 8 Overzicht testen en bepalingen

soa	Soort test	CTG code	opmerking
Gonorrhoe	PCR/NAAT		
	Kweek	75042	Na een positieve PCR
	Resistentiebepalingen	70505	Bij positieve kweek: resistentiebepaling op maximaal 4 relevante antibiotica (declaratie voor 1 disk diffusietest).
Chlamydia	PCR/NAAT	70003	
	genotypering	70007	bij positieve test gevolgd door LGV typering
Syfilis			
	TPPA/TPHA	70626	Als screeningstest en indien IgG-EIA niet is uitgevoerd
	IgG-EIA	71118	Als screeningstest en indien TPPA/TPHA niet is uitgevoerd
	VDRL/RPR	70628	Indien TPHA/TPPA of IgG-EIA positief, of bij vermoeden primaire lues
	FTA-Abs	70627	Ter confirmatie en indien IgG-blot niet is uitgevoerd
	IgG-blot	70185	Ter confirmatie en indien FTA-abs niet is uitgevoerd
HIV	HIV combi antistof/antigeen	71118	Indien geen sneltest of HIV antistoffen is toegepast, of sneltest positieve uitslag heeft
	PCR/NAAT op HIV RNA		
	Western blot	70185	Ter confirmatie van positieve uitslag van
Hepatitis-B	Anti-HBc	71118	Als screeningstest
	Anti-HBs	71118	Indien anti-HBc positief is
	HbsAg	71105	Indien anti-HBc positief is
Hepatitis-C	Anti-HCV		

Naast deze bovengenoemde testen worden ook nog een beperkt aantal losse aanvullende testen uitgevraagd gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst

PrEP consulten:

a. Startconsult

- Ct/go/syfilis/hiv (conform pakket C) + HCV antistoffen (+ evt. screening op HBV*)
- HCV-RNA-test(bij positieve antistoftest of HCV in de voorgeschiedenis, uit onderzoek bij max 5% van de cliënten geïndiceerd).
- Cliënten zijn in principe al gevaccineerd tegen hepatitis B --> en zo nee (of indien vaccinatie niet succesvol was): elke 6 maanden anti-HBc (situatie komt incidenteel voor)
- Nierfunctie: kreatinine en eGFR (klaring)

b. Incidenteel consult: nierfunctie (kreatinine en eGFR (klaring). Wordt vooral ter controle

gedaan, bijv. indien recent afname nierfunctie vastgesteld, of als kans hierop verhoogd is (i.v.m. bepaald medicatiegebruik).

- c. Eerste vervolgconsult (1 maand na startconsult)
 - 4e generatie hiv-combotest
 - Nierfunctie: kreatinine en eGFR (klaring)
- d. (Driemaandelijkse) vervolgconsulten
 - Ct/go/syfilis/hiv (conform pakket C)
 - HCV-antistoffen (elke 3 maanden); bij positieve antistoftest vindt 1 keer per jaar HCV-RNA-bepaling plaats.
 - Nierfunctie kreatinine en eGFR (klaring) (elke 6 maanden; vaker indien afwijkend)