

> Retouradres: Postbus ,

A.B. van der Test
Teststraat 28 B
8888 XX TESTSTAD-UTPEC HT



Geboortedatum: 31-12-1962

Kenmerk: K6BD83FL



Datum: 31 december 2000

Betreft: bevolkingsonderzoek borstkanker voor vrouwen met borstprothesen

Geachte mevrouw Van der Test,

Graag informeren we u over het bevolkingsonderzoek borstkanker voor vrouwen met borstprothesen.

Wel te beoordelen

Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto's van uw borsten. Prothesen laten geen röntgenstralen door. Het kan zijn dat daarom een deel van uw borstweefsel niet te zien is op de foto. Dit hangt af van de plaats en de grootte van de prothesen. Bij de meeste vrouwen met borstprothesen zien de radiologen voldoende borstweefsel om de röntgenfoto's te kunnen beoordelen. De uitslag gaat over het deel van het borstweefsel dat zichtbaar is op de foto.

Niet te beoordelen

Bij een kleine groep vrouwen met borstprothesen zien de radiologen te weinig borstweefsel om de röntgenfoto's goed te kunnen beoordelen. Als de radiologen onvoldoende borstweefsel zien, informeren we u en uw huisarts hierover. Als de röntgenfoto's niet voldoende informatie geven om ze te kunnen beoordelen, hoeft dat een volgende keer niet weer zo te zijn. Borsten kunnen veranderen in de loop van de tijd, bijvoorbeeld door gewichtsverandering of door verwijdering van prothesen. Als al het klierweefsel uit uw borst(en) verwijderd is, is het bevolkingsonderzoek niet zinvol voor u.

Risico's

Uw borsten worden tijdens het maken van borstfoto's aangedrukt. Volgens plastisch chirurgen is het risico dat de prothesen daardoor kapot gaan heel klein. Vertel de laborant voordat de foto's worden gemaakt dat u een prothese heeft. Dan kan de laborant bij het aandrukken van uw borsten daar rekening mee houden. Wel adviseren we u om een wachttijd van 6 maanden na plaatsing van uw prothesen aan te houden, omdat de plek nog gevoelig kan zijn.

PIP-implantaten hebben een grotere kans op scheuren, lekken en 'zweten' dan andere implantaten. Het is verstandig uw PIP-implantaten hierop te laten controleren voordat u deelneemt aan het bevolkingsonderzoek. Meer informatie over scheuring en verwijdering van PIP-implantaten vindt u op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (www.igj.nl).

Heeft u vragen?

Bel dan onze informatielijn 06-123456789 (Vrije tekst client portaal veld). U kunt ook kijken op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. Heeft u vragen over uw gezondheid? Bel dan uw huisarts.

Met vriendelijke groet,

Ginel E. van Weering
bestuurder

3_20_111_101220



123456789

> Retouradres: Postbus 551, 1110 AN Diemen

Bevolkingsonderzoek Midden-West
t.a.v. Print & Mail
Hoogoorddreef 54-e
1101 BE AMSTERDAM



Datum: 11-07-2022

ACPT
ACPT

Wel te beoordelen

Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto's van uw borsten. Prothesen laten geen röntgenstralen door. Het kan zijn dat daarom een deel van uw borstweefsel niet te zien is op de foto. Dit hangt af van de plaats en de grootte van de prothesen. Bij de meeste vrouwen met borstprothesen zien de radiologen voldoende borstweefsel om de röntgenfoto's te kunnen beoordelen. De uitslag gaat over het deel van het borstweefsel dat zichtbaar is op de foto.

Niet te beoordelen

Bij een kleine groep vrouwen met borstprothesen zien de radiologen te weinig borstweefsel om de röntgenfoto's goed te kunnen beoordelen. Als de radiologen onvoldoende borstweefsel zien, informeren we u en uw huisarts hierover. Als de röntgenfoto's niet voldoende informatie geven om ze te kunnen beoordelen, hoeft dat een volgende keer niet weer zo te zijn. Borsten kunnen veranderen in de loop van de tijd, bijvoorbeeld door gewichtsverandering of door verwijdering van prothesen. Als al het klierweefsel uit uw borst(en) verwijderd is, is het bevolkingsonderzoek niet zinvol voor u.

Risico's

Uw borsten worden tijdens het maken van borstfoto's aangedrukt. Volgens plastisch chirurgen is het risico dat de prothesen daardoor kapot gaan heel klein. Vertel de laborant voordat de foto's worden gemaakt dat u een prothese heeft. Dan kan de laborant bij het aandrukken van uw borsten daar rekening mee houden. Wel adviseren we u om een wachttijd van 6 maanden na plaatsing van uw prothesen aan te houden, omdat de plek nog gevoelig kan zijn.

PIP-implantaten hebben een grotere kans op scheuren, lekken en 'zweten' dan andere implantaten. Het is verstandig uw PIP-implantaten hierop te laten controleren voordat u deelneemt aan het bevolkingsonderzoek. Meer informatie over scheuring en verwijdering van PIP-implantaten vindt u op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (www.igj.nl).

Heeft u vragen?

Bel dan onze informatielijn 06-123456789 (Vrije tekst client portaal veld). U kunt ook kijken op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. Heeft u vragen over uw gezondheid? Bel dan uw huisarts.

Met vriendelijke groet,

Ginel E. van Weering
bestuurder

3_20_111_101220