



2e Spintkever alarm

Biologische bescherming met SK Pasta

Afgelopen maanden hebben we te maken gehad met hoge dag- en nachttemperaturen en hevige stormen. Jonge bomen kunnen wat verzwakt zijn en daardoor zeer vatbaar voor spintkevers. Wij verwachten de komende weken de 2e vlucht van de spintkever.

Spintkevers komen voor in bestaande houtwallen en oudere eiken. Na het verpoppen vreten de uitgekomen spintkevers zich uit de boom. Daarna gaan ze op zoek naar een nieuwe locatie. Dat is het moment waarop jonge aanplant extra vatbaar is voor aantasting.

Om aantasting te voorkomen raden wij aan jonge aanplant in te smeren met Spintkeverpasta (SK Pasta).

Waarom is bescherming nodig?

Spintkevers vreten horizontale gangen in het levende hout. Spintkevers komen voor in verschillende eikensoorten. Ook andere boomsoorten kunnen vatbaar zijn, onder andere Fagus, Liriodendron en Styrax. Deze horizontale gangen kunnen er uiteindelijk voor zorgen dat de boom als het ware geringd wordt. De sapstroom is dan onderbroken, waardoor de boom afsterft.

Ziektebeeld

Bij warm weer wordt de spintkever actief. De eerste aantasting, gaatjes in de bast, is vaak zichtbaar op de warme zuidkant van de bast.

Na aantasting (onderbreking van de sapstroom) verkleurt het blad van de boom naar geel/bruin, wat lijkt op verdroging.

Biologische SK Pasta

Onze biologische SK Pasta vormt een geurbarrière op de stam van de boom. Hierdoor is de boom onaantrekkelijk voor spintkevers.

De pasta kan eenvoudig aangebracht worden met een kwast op de stam en het 1e deel van de kroon.

Voor maximaal resultaat moet deze behandeling, in het zomerseizoen, minimaal 3x herhaald worden om de geurbarrière in stand te houden.



M. van den Oever
TREE & PLANT NURSERY SINCE 1791