

Cruydt-Hoeck

O2 – Onderbegroeiing halfschaduw

Zaaidichtheid:

150 gr / are

Hoogte: 25-80 cm

Zaai-instructie: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer of in het vroege voorjaar.

Beheer:

Een- tot tweemaal per jaar afmaaien/afknippen en het maaisel afvoeren.

Deze soorten zitten in het mengsel:

Achillea millefolium - Duizendblad
Agrimonia eupatoria - Gewone agrimonie
Ajuga reptans - Kruipend zenegroen
Alliaria petiolata - Look-zonder-look
Allium carinatum - Berglook
Allium oleraceum - Moeslook
Aquilegia vulgaris - Wilde akelei
Campanula trachelium - Ruig klokje
Chelidonium majus - Stinkende gouwe
Clinopodium vulgare - Borstelkrans
Epipactis helleborine - Brede wespenorchis
Fragaria vesca - Bosaardbei
Geranium pyrenaicum - Bermooievaarsbek
Geranium robertianum - Robertskruid
Geum urbanum - Geel nagelkruid
Hylotelephium telephium - Hemelsleutel
Lathyrus sylvestris - Boslathyrus
Leonurus cardiaca - Hartgespan
Lunaria rediviva - Wilde judaspenning
Myosotis sylvatica - Bosvergeet-mij-nietje
Origanum vulgare - Wilde marjolein
Primula elatior - Slanke sleutelbloem
Prunella vulgaris - Gewone brunel
Silene dioica - Dagkoekoeksbloem
Solidago virgaurea - Echte guldenroede
Stachys sylvatica - Bosandoorn
Stellaria holostea - Grote muur
Teucrium scorodonia - Valse salie
Veronica chamaedrys - Gewone ereprijs
Veronica longifolia - Lange ereprijs
Viola odorata - Maarts viooltje