

Cruydt-Hoeck

W1 Wadi - lichte grond

Zaaidichtheid:

150 gr / are

Hoogte: tot 50 cm

Zaai-instructie: Zaaien in de nazomer/herfst of in het vroege voorjaar.

Beheer:

Afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem een- tot tweemaal per jaar gefaseerd maaien en het maaisel afvoeren.

Deze soorten zitten in het mengsel:

Duizendblad - *Achillea millefolium*
Wilde bertram - *Achillea ptarmica*
Gewoon barbarakruid - *Barbarea vulgaris*
Knoopkruid - *Centaurea jacea*
Groot streepzaad - *Crepis biennis*
Klein streepzaad - *Crepis capillaris*
Peen - *Daucus carota*
Slangenkruid - *Echium vulgare*
Gewone reigersbek - *Erodium cicutarium*
Glad walstro - *Galium mollugo* subsp. *erectum*
Schermhavikskruid - *Hieracium* sectie *Hieracioides*
Sint-Janskruid - *Hypericum perforatum*
Gewoon biggenkruid - *Hypochaeris radicata*
Zandblauwtje - *Jasione montana*
Gewone margriet - *Leucanthemum vulgare*
Gewone rolklaver - *Lotus corniculatus* var. *corniculatus*
Moerasrolklaver - *Lotus pedunculatus*
Gewone veldbies - *Luzula campestris*
Grote kattenstaart - *Lythrum salicaria*
Muskuskaasjeskruid - *Malva moschata*
Middelste teunisbloem - *Oenothera biennis*
Smalle weegbree - *Plantago lanceolata*
Gewone brunel - *Prunella vulgaris*
Scherpe boterbloem - *Ranunculus acris*
Grote ratelaar - *Rhinanthus angustifolius*
Kleine ratelaar - *Rhinanthus minor*
Vertakte leeuwentand - *Scorzoneroïdes autumnalis*
Dagkoekoeksbloem - *Silene dioica*
Echte koekoeksbloem - *Silene flos-cuculi*
Grasmuur - *Stellaria graminea*
Blauwe knoop - *Succisa pratensis*
Gele morgenster - *Tragopogon pratensis* subsp. *pratensis*
Hazenpootje - *Trifolium arvense*