

Cruydt-Hoeck

W2 Wadi - zware grond

Zaaidichtheid

1-1,5 g/m²

Zaai-instructie

Zaaien in de nazomer/herfst of in het vroege voorjaar.

Beheer

Afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem een- tot tweemaal per jaar gefaseerd maaien en het maaisel afvoeren.

Deze soorten zitten in het mengsel:

Duizendblad - *Achillea millefolium*
Wilde bertram - *Achillea ptarmica*
Gewone engelwortel - *Angelica sylvestris*
Gewoon barbarakruid - *Barbarea vulgaris*
Pinksterbloem - *Cardamine pratensis*
Knoopkruid - *Centaurea jacea*
Wilde cichorei - *Cichorium intybus*
Moerasspirea - *Filipendula ulmaria*
Glad walstro - *Galium mollugo* subsp. *erectum*
Veldlathyrus - *Lathyrus pratensis*
Gewone margriet - *Leucanthemum vulgare*
Moerasrolklaver - *Lotus pedunculatus*
Grote wederik - *Lysimachia vulgaris*
Grote kattenstaart - *Lythrum salicaria*
Smalle weegbree - *Plantago lanceolata*
Gewone brunel - *Prunella vulgaris*
Scherpe boterbloem - *Ranunculus acris*
Grote ratelaar - *Rhinanthus angustifolius*
Kleine ratelaar - *Rhinanthus minor*
Vertakte leeuwentand - *Scorzoneroïdes autumnalis*
Dagkoekoeksbloem - *Silene dioica*
Echte koekoeksbloem - *Silene flos-cuculi*
Grasmuur - *Stellaria graminea*
Kleine klaver - *Trifolium dubium*
Rode klaver - *Trifolium pratense*
Gewone ereprijs - *Veronica chamaedrys*
Vogelwikke - *Vicia cracca*